

Información para el paciente

TRATAMIENTO CON BUPROPIÓN

Sello de la Farmacia

- Es un medicamento que actúa sobre los mismos receptores cerebrales de la nicotina, reduciendo la necesidad de fumar.
- Debe seguir el tratamiento como le indique su médico. Podría combinarse con otros productos con nicotina si su médico lo considera oportuno.
- Informe a su médico o farmacéutico si le diagnostican alguna enfermedad o le prescriben un nuevo tratamiento. Podría haber incompatibilidades.
- El efecto secundario más frecuente que puede producirse es el insomnio. Pida ayuda a su médico o farmacéutico si no cede en unos pocos días con una adecuada higiene del sueño.
- Si conduce o maneja maquinaria pesada sea prudente y advierta a su médico o farmacéutico al menor síntoma de mareos o somnolencia. Esto podría ser causa de un accidente.
- Al igual que sucede con el resto de tratamientos del tabaquismo, es una ayuda, pero su voluntad y firmeza es lo que finalmente le hará tener éxito en el objetivo de abandonar el tabaco.

MODO DE EMPLEO: Los días antes del día elegido para dejar de fumar, tome un comprimido diario por las mañanas (150 mg). Al séptimo día debe tomar 2 comprimidos diarios, separados como mínimo por 8 horas y tomando el último comprimido del día al menos 4 horas antes de acostarse. Por ejemplo, uno al levantarse y otro a media tarde. En la segunda semana del inicio del tratamiento, o antes si ya no le apetece, fije un día a partir del cual deje de fumar. El tratamiento dura unas 9-12 semanas.

